erweiterte Notfallversorgung durch Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten im Rhein - Kreis Neuss

das „Notkompetenz“ - System

gesetzliche Grundlagen

§ 3 RettAssG:

„Die Ausbildung soll entsprechend der Aufgabenstellung des Berufs als Helfer des Arztes insbesondere dazu befähigen, am Notfallort bis zur Übernahme der Behandlung durch den Arzt lebensrettende Maßnahmen bei Notfallpatienten durchzuführen.....“

§ 323c StGB (unterlassene Hilfeleistung):

„Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.“

§ 34 StGB (rechtfertigender Notstand):

„Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der ihnen drohenden Gefahren, das geschützte Interesse das beeinträchtigte wesentlich überwiegt. Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden.“

§ 223 StGB (Körperverletzung)

„1) Wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

2) Der Versuch ist strafbar“

§ 228 StGB (Einwilligung)

Wer eine Körperverletzung mit Einwilligung des Patienten vornimmt, handelt nur dann rechtswidrig, wenn die Tat trotz der Einwilligung gegen die guten Sitten verstößt.“

gesetzliche Grundlagen

zu 2: Notkompetenz des Rettungsassistenten

Der Rettungsassistent hat wie jeder Bürger der Pflicht zur Hilfeleistung nach § 323c StGB zu genügen. Darüber hinaus hat er in seiner Rettungsdiensttätigkeit eine **Garantenstellung**, da er sich beruflich dem Rettungsdienst widmet und somit höhere Ansprüche an seine Fähigkeit zur Hilfeleistung gegen sich gelten lassen muss...

...ein Handeln unter Berufung auf die Notkompetenz setzt voraus, dass:

der Rettungsassistent am Notfallort auf sich alleine gestellt ist und eine rechtzeitige ärztliche Hilfe, etwa durch An- oder Nachforderung des Notarztes, nicht erreichbar ist....

die Maßnahmen, die er aufgrund eigener Diagnosestellung und therapeutischer Entscheidung durchführt, zur unmittelbaren Abwehr von Gefahren für das Leben oder die Gesundheit des Notfallpatienten dringend erforderlich sind....

das gleiche Ziel durch weniger eingreifende Maßnahmen nicht erreicht werden kann (Prinzip der Verhältnismäßigkeit bei der Wahl der Mittel)....

die Hilfeleistung nach den besonderen Umständen des Einzelfalles für den Rettungsassistenten zumutbar ist.....

gesetzliche Grundlagen

Vor jeder Notkompetenzmaßnahme ist *im Einzelfall* zu prüfen:

kann ein (Not-) arzt die Einsatzstelle rechtzeitig erreichen?

ist die Maßnahme dringend erforderlich und geeignet?

gibt es weniger invasive Maßnahmen (Verhältnismäßigkeit)?

ist die Maßnahme zumutbar und wird sie beherrscht?

liegt eine Einwilligung des Patienten vor?

✘ ausdrücklich

✘ durch konkludentes (*eine ausdrückliche Willenserklärung rechtswirksam ersetzendes, schlüssiges Verhalten (hier z.B. den Handrücken dem Rettungsassistenten entgegenstrecken)*) Handeln

✘ mutmaßlich

Entwicklung im Bundesgebiet

- Stellungnahme der Bundesärztekammer zur so genannten „Notkompetenz“ - 1992
- erste Veröffentlichungen zu Systemen in Rheinland-Pfalz / Köln
- seit etwa 5 - 8 Jahren zunehmende Verbreitung im Bundesgebiet

Inhalte (Maßnahmen)

- Defibrillation bei Kammerflimmern mit halbautomatischen Defibrillatoren
- peripher-venöse Zugänge
- Infusion von Vollelektrolytlösung
- Atemwegssicherung durch Larynxtubus / *Endotrachealtubus*
- folgende Notfallmedikamente -
 - Nitrolingualspray bei V.a. Herzinfarkt
 - Adrenalin bei Kreislaufstillständen / *allergischem Schock*
 - Verneblung von Medikamenten beim Asthmaanfall
 - nasale Gabe eines Medikaments zur Unterbrechung von cerebralen Krampfanfällen
 - intravenöse Glukosegabe bei bewußtlosen und unterzuckerten Diabetikern

Entwicklung und Struktur im Rhein - Kreis Neuss

Projektkoordination:
Dr. B. Sassenfeld
Jürgen Graw

Entwicklung und Struktur im Rhein - Kreis Neuss

Struktur und Organisation

- 30 h jährliche Fortbildung
- schriftl. / mündl. / prakt. Prüfung durch beteiligten Arzt und Lehrrettungsassistententeam
- gesonderte Dokumentation
- Kontrolle der Einsatzberichte und ggf. Nachbesprechung

Prüfprotokoll Version 3

Malteser

**Feuerwehr
Dormagen
Rettungsdienst**

DRK Neuss
DRK Grevenbroich
Feuerwehr Dormagen
Johanniter RV Niederrhein
Malteser Neuss

Prüfprotokoll
Reanimationsprotokoll

DRK Neuss
DRK Grevenbroich
Feuerwehr Dormagen
Johanniter RV Niederrhein
Malteser Neuss

Notkompetenzsystem

Datum: _____
Beginn: _____ **Uhr** _____
Kopfposition: _____

Basis Maßnahmen	
Vital Check evtl. Puls Kontrolle	
Guedeltubus	
Beutel inkl. Reservoir / Demandventil	
Sauerstoffgabe; Zeit ≤ 30 sek.	
AED u. feste Ableitung verwendet	
2 min. CPR 30:2 (5 Zyklen)	
Kompressionsfrequenz okay? (100/min +/- 10%)	

1. Defibrillation	
evtl. Positionswechsel in Analysephase	
Patientenkontakt während d. Analyse	
Kontrollblick	
Schock angesagt	
1. Schock nach ca. 2 min. (2 ½ bei CPR max)	

erweiterte Maßnahmen	
Einlegen LT@ unter Thoraxkompress.)	
Lagekontrolle LT@ ≤10 sek.	
Korrektur/Entfernung LT@ bei Leckage	
Fixierung LT@	
2 min. CPR 30:2 (5 Zyklen)	
Kompressionsfrequenz okay? (100/min +/- 10%)	

2. Defibrillation	
Positionswechsel in Analysephase	
Patientenkontakt während der Analyse	
Kontrollblick	
Schock angesagt	
Beutel bei Schock von LT@ getrennt	
2. Schock nach ca. 4 min.	

Unterbrechung d. HDM f. Analyse und Defibrillation minimal?	
Beatmung nach ROSC ≤ 15 sek.	
Pulskontrolle hämodyn. Rhythmus	

Leistungskontrolle erfolgreich bei

Kopfposition: ja

Seitenposition: ja

betreuender Arzt

Erstellt	Geprüft/freigegeben	Änderungsstatus
Wer: Barendt Wann: 14.04.08	Wer: Dr. Sassenfeld Wann: s. Datum	Version 2.3

Alarmmeldung: INT_ALARM, H

Notfallsituation:

Ein ca. 45-jähriger Mann sitzt in einer Liege. Haut ist blaß und kaltschweißig.

Anamnese:

Bekannter Bluthochdruck, der mit Beta-Blockern behandelt wird. Beginn der Symptome: vor ca. 30 min.

Bei Nachfrage: Pat. hat noch nie Viagra eingenommen.

Untersuchungsergebnisse:

Atemwege: frei
B / Atmung: Atemfrequenz 18/min
Cirkulation: periphere Pulsation vorhanden
Disability: wach und orientiert

EKG II tachycard
12 Kanal EKG: ST – Streifen
SpO2: 98%
RR: 140 / 90
BZ: 136 mg/dl

Symptome: Brustschmerz
Allergien: nicht bekannt
Medikation: ASS 100 mg
Patientengeschichte: Bluthochdruck
Letzte Mahlzeit: 2 Brötchen
Ereignis: spontan

O nset (Beginn): vor ca. 30 min
P rovokation / Linderung: nach Streifen
Q ualität: retrosternal
R adiation: in den linken Arm
S tärke: 8 (sehr stark)
T (zeitlicher Verlauf): schlagartig

Erstellt	Geprüft/freigegeben	Änderungsstatus	Gültig ab:	Gültig bis:	Seite
Wer: Wohligemuth Wann: 06.12.08	Wer: Dr. Sassenfeld Wann: s. Datum	Version 2.3	01.01.2009	ungültig	6 von 15

DRK Neuss
DRK Grevenbroich
Feuerwehr Dormagen
Johanniter RV Niederrhein
Malteser Neuss

**Asthma / COPD
Prüfungsprotokoll**

**Mündliche Prüfung
Notkompetenzsystem
Rhein – Kreis Neuss**

RA / RAiP _____ **Datum:** _____

Eigenschutz	Ja	Nein	
SAMPLE	Ja	Nein	
ABCD	Ja	Nein	
Notarzttruf	Ja	Nein	

Basismaßnahmen:

Lagerung	Ja	Nein	
Atemanweisung	Ja	Nein	
SpO ₂	Ja	Nein	
Psych. Betreuung	Ja	Nein	
RR Messung	Ja	Nein	
EKG	Ja	Nein	
BZ Messung	Ja	Nein	

Erweiterte Maßnahmen:

Venöser Zugang	Ja	Nein	
Sauerstoffgabe	Ja	Nein	
Verneblung 8l/min	Ja	Nein	
Salbuhexal	Ja	Nein	2,5 mg (2 Amp. je 2,5 ml / 1,25 mg)
Atrovent	Ja	Nein	0,5mg
auf festen Maskensitz geachtet	Ja	Nein	
Kontraindikationen für Salbutamol genannt	Ja	Nein	HF > 150 / min. ACS

Bestanden:	Ja	Nein	
------------	----	------	--

Prüfer: _____

Protokollführender RA _____

Arzt _____

Erstellt	Geprüft/freigegeben	Änderungsstatus	Gültig ab:	Gültig bis:	Seite
Wer: Wohligemuth Wann: 06.12.08	Wer: Dr. Sassenfeld Wann: s. Datum	Version 2.3	01.01.2009	ungültig	11 von 15

Qualitätssicherung

- zeitl. begrenztes Zertifikat
- kontinuierliche Kontrolle der Einsatzberichte
- bidirektionales Feedback
- **Utstein -style - Analyse** (*Überlebensrate der Reanimationspatienten*)

Qualitätssicherung

Verändern die ERC Guidelines 2005 für kardiopulmonale Reanimation das Patientenoutcome beim prähospitalen Herz-Kreislaufstillstand?

J. Stursberg¹, J. Graw², B. Sassenfeld³, D. Ebel⁴

¹ Klinik für Anästhesiologie, Universitätsklinikum, Heinrich-Heine Universität Düsseldorf, Germany
² Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Mittlerer Niederrhein, Lehrrettungswache Meerbusch, Germany
³ Klinik für Anästhesie und operative Intensivmedizin, Städtische Kliniken Neuss Lukaskrankenhaus GmbH, Germany
⁴ Department of Intensive Care Medicine, Medical Centre, Radboud University Nijmegen, The Netherlands

Hintergrund und Fragestellung:

- Die „ERC Guidelines for Resuscitation 2005“ betonen die Bedeutung der Basic Life Supports.
- Möglichst lückenlose Thoraxkompressionen („Push hard and fast“), die neue Kompressions-Ventilations-Ratio (30:2), die 1-Schock-Strategie bei defibrillierbaren Arrhythmien (Kammerflimmern, VF; pulslose Kammer tachykardie, pVT) und die sofortige Wiederaufnahme der Thoraxkompressionen nach einer Defibrillation sind wichtige Änderungen zur Reduktion der „No-Flow-Time“ im Rahmen einer kardiopulmonalen Reanimation (CPR).
- Wir untersuchten, ob sich aus der Implementierung der neuen Reanimationsleitlinien eine Veränderung beim Outcome des prähospitalen Herz-Kreislaufstillstandes (HKS) ergibt.

Material und Methoden:

- Es erfolgte die Auswertung der Jahre 2005 und 2006 des Utstein-Style-basierten Reanimationsregisters der Stadt Neuss (NRW, 150.000 Einwohner).²
- Aus insgesamt 576 prähospitalen Kreislaufstillständen (inklusive Todesfeststellungen) wurden die Reanimationen von Patienten (≥ 18 Jahre) mit Verdacht auf kardial bedingten HKS eingeschlossen.
- Diese Reanimationen wurden untersucht auf:
 - Return of Spontaneous Circulation (ROSC)
 - Primäres Überleben (Spontankreislauf bei Krankenhausaufnahme)
 - Sekundäres Überleben (Krankenhausentlassung)
 - Neurologischer Status bei Entlassung mittels Cerebral Performance Category (CPC).³
- 2005 wurde die CPR gemäß der ERC Guidelines 2000, 2006 gemäß der 2005er Guidelines durchgeführt.
- Statistik: Chi-Quadrat-Test, Fischer's exakter Test, Mann-Whitney-Test, p < 0.05 ist signifikant.

Ergebnisse:

Allgemeine Daten

	2005 (n = 105)	2006 (n = 118)	p-Wert
Anteil Männer, n (%)	64 (61,0%)	84 (71,2%)	0,11
Alter (Jahre; MW ± SD, [Range])	71,3 ± 12,5 [39-94]	69,8 ± 13,1 [39-96]	0,42
Anteil beobachteter HKS / Kollaps, n (%)	64 (61,0%)	74 (62,7%)	0,79
Ort des Kollaps, Anteil daheim, n (%)	76 (72,4%)	90 (76,3%)	0,51
Anteil Laien- Helfer-CPR, n (%)	20 (19,0%)	20 (16,9)	0,68
Anfahrtszeit des Notarztes (min; MW ± SD, [Range])	6,6 ± 3,1 [2-18]	7,0 ± 3,3 [2-21]	0,43
Anteil defibrillierbarer Erst-EKG, n (%)	27 (25,7%)	47 (39,8%)	0,03

Überlebensrate nach CPR (kardial gesamt)

Überlebensrate nach CPR (kardial und VF/pVT)

CPC bei Entlassung

Diskussion:

- Die Auswertung zeigt für das Jahr 2006 Verbesserungen in den Bereichen ROSC, primäres und sekundäres Überleben.
- Insbesondere fallen eine signifikante Zunahme des sekundären Überlebens und eine signifikante Verbesserung des neurologischen Status beim Zeitpunkt der Krankenhausentlassung auf.
- Da diese Veränderungen auch in der Subgruppe „kardial und VF/pVT“ auszumachen sind, lässt sich das positive Ergebnis für 2006 nicht allein durch das häufigere Antreffen von defibrillierbaren Rhythmen als Erst-EKG erklären.

Schlussfolgerung:

- Die Einführung der ERC Guidelines 2005 war im Rettungsdienst der Stadt Neuss mit einem signifikant besseren Überleben und einem ebenfalls signifikant besseren neurologischen Ergebnis assoziiert.
- Unsere Daten sprechen dafür, dass die Anwendung der neuen Reanimationsleitlinien zu einer Outcomeverbesserung beim prähospitalen Herz-Kreislaufstillstand führt.

(1) Resuscitation 2005; 67 (Suppl 1): S1-S169
 (2) Resuscitation 1991; 22: 1-26
 (3) Lancet 1975; 1: 480-484

Kontakt: joerg.stursberg@gmx.de
 DAC 26.04-29.04.2008, Nürnberg, Germany

DRK Neuss
 DRK Grevenbroich
 Feuerwehr Dormagen
 Johanniter RV Niederrhein
 Malteser Neuss

Utstein – Style – Analyse
 Datensatz: Reanimation

Fahrzeugkennung:

Einsatzbezogene Daten:

01 Datum: ____ / ____ / 20____
 tt mm jj

02 Zeit des Kollapses¹: ____ h: ____ min.

03 Einsatznummer: ____ - ____

04 Stadt / Ortsteil: _____

05 Ort d. Kreislaufstillstandes:

zu Hause Arbeitsplatz
 öffentlicher Raum / Strasse Arztpraxis
 Versorgungseinrichtung Sonstiges: _____

06 Ausrückzeit: ____ h ____ min

07 Eintreffzeit: ____ h ____ min.

Patientenbezogene Daten

08 offensichtl. nicht-kardialer Grund 09 keine Reanimationsmaßnahmen

10 Alter: ____ in Jahren

11 Geschlecht: m w

12 CPC ____ OPC ____ vor dem Kreislaufstillstand

13 Kreislaufstillstand:

beobachtet 14 Stillstand d. RD beobachtet: ja
 unbeobachtet nein
 unbekannt

15 Laien – HLW durchgeführt: ja nein

wenn ja, Zeitpunkt der Laien – HLW¹: ____ h ____ min

16 Beginn CPR durch RD²: ____ h ____ min

17 EKG – Rhythmus (bei Eintreffen RD):
 VF / VT durch RA (in Notkompetenz /AED)
 PEA Zeitpunkt: ____ h ____ min
 Asystolie durch NA (auch delegierte Schocks)

18 Zeitpunkt des ersten Schocks:

19 Anzahl der Schocks (gesamt):
 ____ x 150 J ____ x 200 J ____ x 300 J ____ x 360 J

Erstellt	Geprüft/freigegeben	Änderungsstatus	Gültig ab:	Gültig bis:	Seite
Wer: Graw	Wer: Dr. Sassenfeld	Version 2.3	01.01.2009	ungültig	1
Wann: 05.05.07	Wann: s. Datum				von 3

1 = geschätzter Zeitpunkt, 2 = gemessener Zeitpunkt, 3 = bester je erreichter Wert n. Reanimation und vor Entlsgg. o. Tod
 VF – Kammerflimmern, VT – Kammer tachykardie, PEA – Pulslose Elektr. Aktivität, ROSC – Return of Spontaneous Circulation

Qualitätssicherung

The laryngeal tube - An alternative airway device in prehospital cardiopulmonary resuscitation: An analysis of the first year of using this device by paramedics

J. Stursberg¹, A. Köster¹, D. Daverzhofen², J. Graw³, F. Brünnen⁴, L. Barendt⁵, B. Sassenfeld⁶

¹Klinik für Anästhesiologie, Universitätsklinikum, Heinrich-Heine Universität Düsseldorf, Germany
²Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Neuss e.V., Lehrrettungswache Am Südpark
³JUH Regionalverband Mittlerer Niederrhein, Lehrrettungswache Meerbusch
⁴JUH Regionalverband Mittlerer Niederrhein, Lehrrettungswache Neuss-Mitte
⁵Malteser-Hilfsdienst Neuss e.V., Lehrrettungswache Neuss-Nord
⁶Klinik für Anästhesie und operative Intensivmedizin, Städtische Kliniken Neuss Lukaskrankenhaus GmbH

Background:

- The golden standard for the airway management during cardiopulmonary resuscitation (CPR) is still the endotracheal intubation (ET) (1). But for this golden standard the practitioner needs a high skill level in this technique.
- After analysing the former years of our Notkompetenz-System (Rettungsassistenten) in Neuss (Germany), our paramedics intubate about 0.3 times per year. Therefore, the paramedics get only little practical ET experience on their daily work on an ambulance.
- An alternative airway device is the laryngeal tube (LT; VBM Medizintechnik, Germany; Figure 1), a supraglottic airway device.
- We evaluate success rate and problems in using the LT by paramedics during prehospital CPR.

Figure 1

Method:

- Together with the introduction of the new ERC Guidelines 2005 for CPR in the prehospital CPR-protocoll, we implemented the LT for the advanced airway management.
- We educated our paramedics theoretically (45 minutes) and practically (45 minutes) in using the LT.
- The practical training was performed using a manikin (Laerdal® ALS Simulator and Ambu® Cardiac Care Trainer).
- The evaluation of the LT use is based on analysing the emergency protocols (DIVI-Rettungsdienst-Einsatzprotokoll) and a special questionnaire for the LT use.
- Both documentations were obligatory for the paramedics and were collected and analysed by the emergency physicians, who coordinate and supervise the Notkompetenz-System in Neuss.
- Figure 2 shows the CPR-algorithm.

Results:

- From 03/2006 to 02/2007 we registered 47 LT uses (Table 1, Table 2).

Table 1: General data (n = 47):

Age (Years, Mean ± SD, Range)	68 ± 14 (36-86)
Sex ratio (M : F)	32 : 15
Body constitution (valuated by paramedics)	
- Normal	22 / 47
- Adipose	25 / 47
Body height (valuated by paramedics)	
- 155 - 180 cm	27 / 47
- ≥ 180 cm	20 / 47
Suspicion of cardiac genesis of cardiac arrest	35 / 47
ROSC (Return of Spontaneous Circulation)	20 / 47 (42.6%)
Hospitalization with spontaneous circulation	15 / 47 (31.9%)
First rhythm shockable (VF/ pulseless VT)	12 / 47 (25.5%)

Table 2: LT associated data (n = 47):

LT success rate	38 / 47 (80.9%)
Success in the	
- 1st attempt	32 / 38 (84.2%)
- 2nd attempt	6 / 38 (15.8%)
Patient's sex and success	
- Women	13 / 15 (86.7%)
- Men	25 / 32 (78.1%)
Body constitution	
- Normal	19 / 22 (86.4%)
- Adipose	19 / 25 (76.0%)
Uninterrupted compressions after LT-placement	29 / 38 (76.3%)
Emergency physician (EP) carried on with the LT	21 / 38
Admission to hospital with LT	6 / 38
LT-placement failure (after 2 attempts)	9 / 47 (19.1%)
Airway management after LT placement failed:	
- Intubation (ET) by paramedic	1 / 9
- Intubation (ET) by Emergency physician	5 / 9
- Combitube by EP (after ET failed)	2 / 9
- Laryngeal mask by EP (after ET failed)	1 / 9
LT and complications (e. g. aspiration, trauma)	0 / 47
Paramedic's voting: „the LT is easy to handle“	40 / 47 (85.1%)

The CPR-Algorithm:

Figure 2

Conclusion:

- After a 90 minutes training only by using a manikin, paramedics are able to place the LT during prehospital CPR with a high success rate (> 80%).
- Therefore, the LT is an attractive and easy to handle supraglottic airway device, which seems to be an alternative to prolonged bag-mask-ventilation with the danger of gastric insufflation and also for endotracheal intubation, especially if the practitioner has got only low skill level using this technique.

(1) ERC Guidelines for Resuscitation 2005. Resuscitation 2005; 67 (Suppl 1): S39-S86

DRK Neuss
 DRK Grevenbroich
 Feuerwehr Dormagen
 Johanniter RV Niederrhein
 Malteser Neuss

Fragebogen zur
 präklinischen
 Atemwegssicherung
 (Larynxtubus)

Notkompetenzsystem
 Rhein – Kreis Neuss
 Anhang

Bitte bei jeder präklinischen Benutzung des Larynxtubus (LT) ausfüllen und an das Rettungsdienstprotokoll anheften. Fragebogen gehen bitte mit Protokoll an den verantwortlichen LRA, welcher das Notkompetenz-System vor Ort betreut und dann bitte weiter an Frau Dr. Sassenfeld.

Einsatznummer der Leitstelle:

Datum des Einsatzes:

Alarmierungszeit:

1. Einsatztechnische Daten:

1.1. Welches Rettungsmittel wurde primär entsendet

(Bitte ankreuzen)

KTW RTW NAW NEF

1.2. Welches Rettungsmittel führt Atemwegssicherung aus

(Bitte ankreuzen)

KTW RTW NAW NEF

1.3. Besatzungsstärke des Rettungsmittels

(welches Atemwegssicherung ausführt; bitte Anzahl angeben, z.B. (2) RettAss und (1)Praktikant)

() RettSan () RettAss () Praktikant () Arzt

1.4. Alarmierung:

(Bitte ankreuzen)

Normal Alarm Mit Notarzt

1.5. Notarzt-Nachforderung:

(Bitte ankreuzen)

Ja Nein Primär mit Notarzt alarmiert

1.6. Welcher Notarzt war vor Ort:

(Bitte Kennung angeben, z.B. 6-82-1 oder Christoph 3:

2. Notfallmedizinische Daten:

2.1. Alter des Patienten (in Jahren):

2.2. Geschlecht des Patienten:

(Bitte ankreuzen)

Weiblich Männlich

2.3. Ernährungszustand:

(Bitte ankreuzen)

schlank normal übergewichtig

Erstellt	Geprüft/freigegeben	Anderungsstatus	Gültig ab:	Gültig bis:	Seite
Wer: Stursberg	Wer: Dr. Sassenfeld	Version 2.3	01.01.2009	ungültig	Seite 1 von 4
Wann: 24.10.07	Wann: s. Datum				

das Rettungsdienstkompendium

früher: Notkompetenzskript

Kompendium Rettungsdienst Version 2.3 - 2009

Feuerwehr
Dormagen
Rettungsdienst

**DIE
JOHANNITER**

Deutsches Rotes Kreuz

das Rettungsdienstkompendium

früher: Notkompetenzskript

- jährliche Aktualisierung (*neue Leitlinien der Fachgesellschaften / Feedback der Anwender*)
- gesetzl. Grundlagen
- Behandlungsprotokolle (*Algorithmen*)
- theoret. Grundlagen
- Zusatzinformationen

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**